

ACHTUNG!

Informationen zur korrekten Unterscheidung von juvenilen kanadischen Seeforellen und Seesaiblingen:





Die Unterscheidung von juvenilen kanadischen Seeforellen und Seesaiblingen (Fische unter 30cm) ist ohne direkten Vergleich immer schwierig. Bei diesem 26cm langen Fisch aus dem Silsersee handelt es sich um eine kanadische Seeforelle:



Foto: Matthias Escher, Aqua-Sana

Das verlässlichste Merkmal ist dabei das Fehlen der Pigmentierung des oberen Gaumens und der Zunge.

Ausgewachsen sind die Fische einfach zu unterscheiden:

| Kanadische Seeforelle (<i>Salvelinus namaycush</i>) - adult | Seesaibling (<i>Salvelinus alpinus</i>) - adult |
|--|--|
| Fotos: Michel Roggo  |  |
| Rücken: häufig etwas marmoriert | Rücken: selten/kaum marmoriert |
| Schwanzflosse: etwas weiter eingeschnitten | Schwanzflosse: etwas weniger eingeschnitten |
| Kopfform: oben etwas abgeflacht | Kopfform: vergleichbar mit Bachforelle |
| Farbe vom oberen Gaumen und der Zunge: immer weiss  <p>Unterschied auch bei Juvenilen erkennbar!</p> | Farbe vom oberen Gaumen und der Zunge: grau pigmentiert  <p>Unterschied auch bei Juvenilen erkennbar!</p> |
| Fotos: Reto Mani, Fischereiaufseher Kt. BE | |

Es gilt zu beachten, dass die Kriterien wie weit die Schwanzflossen eingeschnitten ist, die Marmorierung über dem Rücken oder die Kopfform als Unterscheidungsmerkmale nicht genügen! Am einfachsten ist es auf die Pigmentierung in der Mundhöhle zu achten.